

- А) Промыть рану питьевой водой с мылом;
- Б) Обратиться для обработки раны в медицинское учреждение;
- В) Промыть рану йодом, бетадином или 70% спиртом, затем нанести мазь с антибиотиком и забинтовать поврежденное место;
- Г) Протереть рану стерильной салфеткой.

12. При носовом кровотечении пострадавшему нельзя позволять...

- А) Запрокидывать голову назад;
- Б) Прикладывать к области носа пакетик со льдом;
- В) Сжимать себе ноздри;
- Г) Высмаркиваться.

13. Чей укус может вызвать аллергию?

- А) Собаки;
- Б) Медянки;
- В) Шмеля;
- Г) Летучей мыши.

14. Можно ли использовать в качестве перевязочного материала при ожоге полиэтилен?

- А) Да, потому что он не липнет к ране;
- Б) Да, но только если сверху будет наложена бинтовая повязка;
- В) Да, но только если вы уверены, что он стерилен;
- Г) Нет.

15. Как называется повязка, которая укрепляется отдельно оторванной полоской бинта за нижнюю челюсть?

<p>16. Укажите транспортное положение пострадавшего при значительной кровопотере:</p>	<p>А) Положение лежа на спине</p> <p>Б) Положение лежа на спине с возвышенным головным концом</p> <p>В) Положение лежа на спине с поднятыми ногами</p> <p>Г) Положение лежа на спине с согнутыми ногами</p> <p>Д) Положение полусидя</p> <p>Е) Положение лежа на спине с согнутыми ногами</p> <p>Ж) боковое положение</p>
<p>А), Б), В), Г), Д), Е), Ж)</p>	
<p>17. Определите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки, пострадавший в сознании:</p>	
<p>А), Б), В), Г), Д), Е), Ж)</p>	

18. Как называется тяжёлая внезапно возникающая аллергическая реакция?

- А) Пневмоторакс;
- Б) Анафилактический шок;
- В) Авульсия;
- Г) Аспирация.

19. При сердечно-лёгочной реанимации нажатия на грудину следует осуществлять...

- А) Ладонью;
- Б) Основанием ладони;
- В) Кулаком;
- Г) Коленом.

20. Если пострадавший лежит в «позе лягушки», следует предположить, что у него...

- А) Травма позвоночника;
- Б) Открытый пневмоторакс;
- В) Перелом таза или тазобедренного сустава;
- Г) Эпилептический припадок.